

**Desinfectante para instalaciones de crianza
Bactericida, fungicida y virucida****FORMULA**

Didecildimetilamonium cloruro 18.75 g
Dioctildimetilamonium cloruro 18.75 g
Octildecidimetilamonium cloruro 37.50 g
Alquildimetilbenzilamonium cloruro 50.00 g
Glutaraldehído 62.50 g
Excipientes (aceite de pino, terpineol...) c.s.p 1000 ml

INDICACIONES

TH4+ es una mezcla de glutaraldehído y de 4 amonios cuaternarios, con una eficacia comprobada sobre bacterias, micoplasmas, hongos y sobre todos los virus responsables de las enfermedades importantes en animales.
TH4+ es efectivo aún en agua dura y en presencia de suciedad.

ESPECIES DE DESTINO

Aves - Porcinos - ovinos - ganado vacuno - caprinos - conejos

INSTRUCCIONES DE USO

TH4+ es aplicable por atomización, vaporización, inmersión a las dosis siguientes:

-Atomización: 0.3 litros de solución diluida por cada m².

-Nebulización: 5 ml de TH4+ por cada m³.

-Termonebulización: aplicar TH4+ a una dosis de:

- 2.5 ml por cada m³, 4 horas de tiempo de contacto (equivalente a aproximadamente 7.5 litros para 3000 m³ o 1000 m²) o
- 1.5 ml por cada m³, 6 horas de tiempo de contacto (equivalente a aproximadamente 4.5 litros para 3000 m³ o 1000 m²).

En la industria alimenticia es necesario enjuagar con agua potable después de la desinfección.

TH4+ se puede aplicar para la desinfección a una dosis 0.5%.

Las dosis siguientes son las dosis recomendadas. Pueden ser aumentadas en circunstancias especiales como epidemias, patologías significativas, proliferación microbiana.

Dosis recomendadas:

- virus: 0.5% (1:200)
- bacteria y hongos: 0.5% (1:200)
- algas: 0.5% (1:200).

PRECAUCIONES EN SU USO

Ver en la etiqueta.

PACKAGING

1, 5, 10, 25, 60 y 200 litros.